

STIMOL®

CITRULLINE MALATE

Read all of this leaflet carefully before you start receiving the drug.

Keep this leaflet. You may need to read it again. If you have further questions, please ask your doctor.

Composition of the medicine:

Active ingredient: 1 sachet contains citrulline malate 1,0 g;

Excipients: natural sangria orange solution, concentrated sodium hydroxide solution, purified water.

Pharmaceutical form. Oral solution.

Pharmacotherapeutic group. Digestive system and metabolism. The product belongs to amino acids.

Pharmacological properties. Stimol utilizes lactate, ammonium, stimulates energy release, brings the cell to another energetic level.

Indications.

Symptomatic treatment of functional asthenia such as:

- physical asthenia;
- mental asthenia,
- post-infectious asthenia;
- post-operative asthenia;
- senile asthenia,
- asthenia of endocrinology origin (diabetic) ;
- sportsmen's asthenia (muscle pain relief after the intensive training);
- asthenia and vegetative syndrome by vegetal and vascular dystonia hypotonic type;
- alcohol withdrawal syndrome;
- sexual asthenia.

Administrate in case of the following symptoms of asthenia: general weakness, emotional lability, chronic tiredness, low capacity for work, drowse.

Recommended to administrate in cases of muscle pain and cramps, resulting from the accumulation of lactate after the heavy training.

This product is recommended for the period of recovery.

Contra-indications.

Hypersensitivity to any of the component of the product. Stomach and duodenal ulcer. Children under 6 years.

Warnings.

One sachet contains about 30 mg (1,3 mmol) of sodium to make pH solution 3,3. It must be taken into the account for patients with a salt free diet. It does not contain sugar. This medicine should not be used during pregnancy and lactation.

Interactions with other drugs.

Not observed.

Methods of administration and dosage

Children over 6 years: 2 sachets per day.

Adult: 3 sachets per day.

Recommended duration of treatment – 4 weeks.

Stimol® should be taken during meals. Content of sachet should be diluted up to 100 ml by water or sweetened beverages.

Side effects

Several cases of discomfort in epigastrium without cancellation of administration. Point out to your physician every undesirable effect.

Shelf-life.

3 years. Do not administrate after expiry date indicated on the box.

Storage conditions. To store at the room temperature (15-25°C), keep away from children.

Packing. 18 sachets in aluminium and polyethylene paper in carton box.

Sales condition. Without prescription.

Name and address of manufacturer

BIOCODEX, 7 avenue Gallieni 94250 Gentilly - France.

STIMOL®

CITRULLINE MALATE

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
14.12.2012 № 1048
Реєстраційне посвідчення
№ UA/6937/01/01

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

СТИМОЛ®
(STIMOL®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 пакетик містить цитруліну малату 1 г;

допоміжні речовини: натуральний розчин апельсинової сангрії, концентрований розчин натрію гідроксиду, вода очищена.

Лікарська форма.

Розчин орального. Безбарвна або жовтувата рідина з апельсиновим запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

БЮКОДЕКС.

Юридична адреса: 7, авеню Гальєні, 94250 Жантиллі – Франція/7 avenue Gallieni 94250 Gentilly – France.

Адреса виробництва: 1 Авеню Блез Паскаль, 60000 Бове, Франція/1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, France.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Амінокислоти та їх похідні.

Код АТС А16А А.

Стимол® – це комбінація L-цитруліну та малату. Малат стимулює цикл Кребса та активує механізм утворення енергії на клітинному рівні, знижує рівень лактату в крові та тканинах, запобігає розвитку молочнокислого ацидозу та підвищує рівень АТФ. Цитрулін – це одна з амінокислот, яка входить до циклу сечовини, активує утворення та виведення сечовини з організму.

Стимол® швидко всмоктується у кишечнику. Після застосування 4 г цитруліну малату максимальна концентрація досягається через 45 хвилин і перевищує в 6-15 разів базальний рівень у плазмі крові. Препарат виводиться протягом 5-6 годин нирками.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування функціональної астенії:

- фізична астенія;
- психічна астенія;
- постінфекційна астенія;
- післяопераційна астенія;
- астенія у літньому віці;

- астенія ендокринного походження (при цукровому діабеті);
- астенія у спортсменів (препарат знімає біль у м'язах після інтенсивних тренувань);
- вегето-судинна дистонія за гіпотонічним типом;
- алкогольно-абстинентний синдром;
- сексуальна астенія.

Препарат показаний при симптомах астенії: загальна слабкість, емоційна лабільність, хронічна втома, низька працездатність, сонливість.

Препарат показаний при м'язовому болю та судом, спричинених накопиченням лактату після фізичних навантажень. Рекомендований у період реконвалесценції при захворюваннях, що призводять до розвитку астеновегетативного синдрому.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату. Виразка шлунка або дванадцятипалої кишки.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Один пакетик Стимолу® містить приблизно 30 мг (1,3 ммоль) натрію для доведення рН розчину до 3,3. Це необхідно враховувати при застосуванні препарату хворим, які перебувають на безсольовій дієті.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Ефективність і безпека застосування препарату дітям до 6 років вивчені недостатньо. Препарат застосовувати дітям віком від 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати внутрішньо, попередньо розчинивши вміст пакетика в 100 мл води або підсолодженого напою. Приймати під час їди.

Дорослим: по 1 пакетуку 3 рази на день.

Дітям віком від 6 років: по 1 пакетуку 2 рази на день.

Рекомендований термін лікування – 4 тижні.

Передозування.

Не описане.

Побічні ефекти. В окремих випадках можливий незначний біль в епігастрії, алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 мл у пакетуку. По 18 пакетиків у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду. 14.12.2012.

STIMOL®

CITRULLINE MALATE

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства
здравоохранения Украины

14.12.2012 № 1048

Регистрационное удостоверение
№ UA/6937/01/01

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата СТИМОЛ® (STIMOL®)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: 1 пакетик содержит цитруллина малата 1 г;
вспомогательные вещества: натуральный раствор апельсиновой сангрии, концентрированный раствор натрия гидроксида, вода очищенная.

Лекарственная форма.

Раствор оральный.
Бесцветная или желтоватая жидкость с апельсиновым запахом.

Название и местонахождение производителя.

БИОКОДЕКС.

Юридический адрес: 7, авеню Гальени, 94250 Жантиллы – Франция/7 avenue Gallieni 94250 Gentilly – France.

Адрес производства: 1 Авеню Блез Паскаль, 60000 Бове, Франция/1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, France.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. Аминокислоты и их производные.

Код АТС А16А А.

Стимол® – это комбинация L-цитруллина и малата. Малат стимулирует цикл Кребса и активизирует механизм образования энергии на клеточном уровне, снижает уровень лактата в крови и тканях, предотвращает развитие молочнокислого ацидоза и повышает уровень АТФ. Цитруллин – это одна из аминокислот, которая входит в цикл мочевины, активизирует образование и выведение мочевины из организма.

Стимол® быстро всасывается в кишечнике. После приема 4 г цитруллина малата максимальная концентрация достигается через 45 минут и превышает в 6-15 раз базальный уровень в плазме крови. Препарат выводится в течение 5-6 часов почками.

Показания к применению.

Симптоматическое лечение астении:

- физическая астения;
- психическая астения;
- постинфекционная астения;
- послеоперационная астения;
- астения в пожилом возрасте;
- астения эндокринного происхождения (при сахарном диабете);
- астения у спортсменов (препарат снимает мышечную боль в мышцах после интенсивных тренировок);
- вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу;
- алкогольно-абстинентный синдром;
- сексуальная астения.

Препарат показан при симптомах астении: общая слабость, эмоциональная лабильность, хроническая усталость, низкая трудоспособность, сонливость.

Препарат показан при мышечной боли и судорогах, которые появляются вследствие накопления лактата после физических нагрузок. Препарат рекомендован в период реконвалесценции заболеваний, которые приводят к развитию астеновегетативного синдрома.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки.

Надлежащие меры безопасности при применении. Один пакетик Стимол® содержит примерно 30 мг (1,3 ммоль) натрия для доведения pH раствора до 3,3. Это необходимо учитывать при назначении препарата больным, находящимся на бессолевой диете.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не применять в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата детям до 6 лет изучены недостаточно.

Препарат применять детям старше 6 лет.

Способ применения и дозы.

Применять внутрь, предварительно растворив содержимое пакетика в 100 мл воды или подслащенного напитка. Принимать во время еды.

Взрослым: по 1 пакету 3 раза в день.

Детям старше 6 лет: по 1 пакету 2 раза в день.

Рекомендуемый курс лечения – 4 недели.

Передозировка. Не описана.

Побочные эффекты. В отдельных случаях возможна незначительная боль в эпигастрии, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Не выявлено.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 10 мл в пакетике. По 18 пакетиков в картонной коробке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра. 14.12.2012.